

SUMS-Health



دانشگاه علوم پزشکی شیراز
دانشکده بهداشت
گروه آموزشی اپیدمیولوژی

فرم تبادل و ترجمان دانش (KTE*)

عنوان طرح / رساله: بررسی شیوع مصرف همزمان چند دارو و عوامل مرتبط با آن در بیماران کم خونی داسی شکل در مراکز درمانی شهر بوشهر. ۱۴۰۱



عبدالله امینی

مشخصات طرح مرتبط

مجری اصلی: دکتر جعفر حسن زاده، دکتر حسین مولوی

شناسه ملی اخلاق در پژوهش: IR.SUMS.SCHEANUT.REC.1401.079

کد طرح: ۲۵۶۲۲

تاریخ اتمام طرح: ۱۴۰۲/۱۱/۲۹

عنوان خبر: شیوع مصرف همزمان چند دارو و عوامل مرتبط با آن در بیماران کم خونی داسی شکل در مراکز درمانی شهر بوشهر در سال ۱۴۰۱ بررسی شد.

اطلاعات تماس:

Email
:

Tel: +98
(71)37251001

Fax: +98 (71)362
60225

نشانی:

شیراز-بلوار رازی-دانشکده
بهداشت

کد پستی: ۷۱۵۳۶۷۵۵۴۱

ORCID No.:0009-
0001-8761-9572

متن خبر (حداکثر ۲۵۰ کلمه به زبان غیر علمی):

بیماری کم خونی داسی شکل یک از انواع بیماری های خونی و مزمن است که بیمار در طی آن دچار اختلالات متعددی مانند بحران های شدید درد، اختلالات قلبی، کبدی، صفراوی و یا مرگ بافت در اثر کم خونی می شود. بیمار به خاطر کنترل این عوارض باید داروهای متعددی را به صورت همزمان استفاده کند که این موضوع باعث مصرف همزمان چند دارو در این بیماران می شود. مصرف همزمان چند دارو احتمال بستری شدن در بیمارستان، تداخلات دارویی خطرناک و عوارض جانبی را افزایش می دهد و از طرفی دیگر هزینه های بیمار را بالا می برد. لذا مطالعه ای با هدف تعیین شیوع مصرف همزمان چند دارو در شهر بوشهر انجام دادیم. شیوع مصرف همزمان چند دارو ۲۶٫۳ درصد تخمین زده شد. عواملی که باعث افزایش مصرف همزمان چند دارو در بین بیماران کم خونی داسی شکل استان بوشهر شدند شامل سن بالاتر از ۵۹ سال، کیفیت زندگی با مشکلات شدید، شاخص توده بدنی بالاتر از ۳۰، سابقه بستری در بیمارستان و داشتن چند بیماری همزمان بودند.

گروه های هدف:

رسانه ها و مردم ☒

متخصصان و پژوهشگران ☒

سیاستگذاران پژوهشی ☒

سیاستگذاران درمانی ☒

مدیران نهادها و سازمانهای ... ☒

مقاله مستخرج از طرح: الگوی مصرف دارو و شیوع چند دارویی و عوامل مرتبط با آن در بیماران کم خونی داسی شکل: یک مطالعه مبتنی بر جمعیت در جنوب

ایران، سابمیت در جورنال بررسی تخصص هماتولوژی